

Preen[®]

SOUTHERN

WEED PREVENTER

Controlador de malezas de jardín

STOP WEEDS*
Before They Start!

Blocks Weeds*
Up To 4 Months Guaranteed!
Covers 1000 Sq. Ft.

ACTIVE INGREDIENT:
Dithiopyr..... 0.27%
OTHER INGREDIENTS: ... 99.73%
TOTAL 100.00%

*See Use Directions for complete list of treated weeds.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION

See back panel for First Aid and additional Precautionary Statements.

• NOT FOR USE •
ON VEGETABLE GARDENS
OR LAWNS

Net Wt. 4.25 lbs. (1.93 kg)

Preen[®]

SOUTHERN

WEED PREVENTER

**Not for Use on Vegetable
Gardens or Lawns**

**STOP WEEDS*
Before They Start!**

Precautionary Statements

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

First Aid

- | | |
|------------------------------------|---|
| IF IN EYES: | <ul style="list-style-type: none">• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.• Remove contact lenses, if present after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.• Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| IF SWALLOWED: | <ul style="list-style-type: none">• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.• Have person sip a glass of water if able to swallow.• Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.• Do not give anything by mouth to an unconscious person. |
| IF ON SKIN
OR CLOTHING: | <ul style="list-style-type: none">• Take off contaminated clothing.• Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.• Call a poison control center or doctor for treatment advice. |
| IF INHALED: | <ul style="list-style-type: none">• Move person to fresh air.• If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible.• Call a poison control center or doctor for further treatment advice. |

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For Emergency Medical Information call (888) 208-1368.

Environmental Hazards

This product is toxic to fish. Drift and runoff may adversely affect aquatic organisms. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather will help to ensure that wind does not blow pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

SEE INSIDE BOOKLET FOR COMPLETE DIRECTIONS FOR USE AND PLANT LISTINGS

Consulte el folleto en interior para ver el modo de empleo completo y listas de plantas



1-800-233-1067
www.preen.com



Preen[®] is a registered trademark of Lebanon Seaboard Corporation. (L) (D)
EPA Reg. No. 961-410 | EPA Est. No. 961-PA-01-961-IL-01
Superscript used is first letter of lot number.

*See Use Directions for complete list of treated weeds.

Manufactured by Lebanon Seaboard Corporation
1600 East Cumberland Street | Lebanon, PA 17042



0 88685 63843 5
PROOF OF PURCHASE | Comprobante de compra

LIFT HERE TO OPEN | PRESSE TO RESEAL • Levante aquí para abrir | Presione para volver a cerrar

Killing Weeds vs. Weed Prevention



Pulling or spraying only eliminates weeds already above ground.



Preventing creates a weed barrier that stops weeds* from germinating.

Reapply product every 4 months. It's never too late or too early to apply Preen Southern Weed Preventer! Use around listed flowers, trees & shrubs.

*See Use Directions for complete list of treated weeds.

Scan the code to watch how Preen prevents weeds or visit: www.preen.com/preventweeds



The Preen Routine *Easy Steps to Weed Prevention*



Remove Existing Weeds



Sprinkle Product Evenly



Water Product Into Soil

Precautionary Statements

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION

Causes moderate eye irritation. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

Refill Instructions

This container with applicator cap is reusable with Preen Southern Weed Preventer. Refill the container with desired amount of this product and use as directed. When done, store or dispose this container as listed on the label.

Storage and Disposal

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

Pesticide Storage: Store product in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals.

Pesticide Disposal and Container Handling: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container except as described in the DIRECTIONS FOR USE (see Refill Instructions). If **empty:** Place in trash or offer for recycling if available. If **partly filled:** Call your local waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



1-800-233-1067

www.preen.com



Preen® is a registered trademark of Lebanon Seaboard Corporation. (L) (D)
EPA Reg. No. 961-410 | EPA Est. No. 961-PA-01-961-IL-01
Superscript used is first letter of lot number.

Preen

SOUTHERN

WEED PREVENTER

Not for Use on Vegetable Gardens or Lawns

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION

See container label for First Aid and Additional Precautionary Statements
*See Use Directions for complete list of treated weeds.

STOP WEEDS* Before They Start!

ACTIVE INGREDIENT: Dithiopyr.....0.27%
OTHER INGREDIENTS:.....99.73%
TOTAL.....100.00%

Directions For Use

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Product Information

Preen Southern Weed Preventer prevents most weeds from germinating for up to 4 months in flower beds, and around ground covers, trees and shrubs. Although this product will not kill existing weeds, it will prevent new listed weeds from sprouting—eliminating the need for difficult and time-consuming hand weeding. Without weeds, your valuable plants can grow larger and stronger. Your beds will stay neat all season long.

PRECAUTIONS AND RESTRICTIONS

Not for use on plants being grown for sale or other commercial use, or for commercial seed production or for research purposes. For use on plants intended for aesthetic purposes or climatic modifications and being grown in ornamental gardens. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

INTENDED FOR RESIDENTIAL USE / NOT FOR USE ON VEGETABLE GARDENS OR LAWNS

Only apply Preen Southern Weed Preventer to established ornamental plants listed on this label. Do not apply to plants that are under stress. Do not over-apply or mix this product into the soil, as injury may occur to plants which are sensitive to Preen Southern Weed Preventer. **This product is not for use on vegetable gardens or lawns,** or for use in enclosed areas, such as greenhouses. Do not apply another herbicide within 4 weeks of application of this product. Do not apply more than 4.25 lbs. of this product per 1,000 sq. ft. per application, and no more than 12.75 lbs. of this product per 1,000 sq. ft. per year.

In the state of New York, do not apply more than 2.1 lbs. per 1,000 sq. ft. per year (equivalent to 0.25 pounds of active ingredient per acre). Use of this product in Nassau and Suffolk counties of New York is prohibited.

ENTRY RESTRICTIONS

Do not allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled. If product is watered-in, do not enter or allow others to enter the treated areas (except those involved in the watering) until the watering-in is complete and the surface is dry.

Weeds Controlled

GRASSY WEEDS

Barley
Barnyardgrass
Bluegrass: Annual
Brome

Buttercup Crabgrass:
Large, Smooth, Southern
Crowfootgrass
Dallisgrass (seedling)
Goosegrass

Foxtail: Green, Yellow
Kikuyugrass
Oats, Wild
Ryegrass: Annual,
Perennial

Sandbur
Smutgrass

BROADLEAF WEEDS

Bittercress
Carpetweed
Chickweed
Geranium, Carolina
Henbit

Knotweed, Prostrate
Lespedeza, Common
Lambsquarters
Marestail
Medic, Black
Mustard

Pineappleweed
Pigweed, Redroot
Parsely-piert
Purslane, Common
Rocket, London
Shepherdspurse

Speedwell, Corn
Spurge: Garden,
Prostrate, Spotted
Woodsorrel:
Creeping, Yellow

When To Apply Preen Southern Weed Preventer

Apply Preen Southern Weed Preventer during the growing season only around established plants. Preen Southern Weed Preventer should not be used on flower seeds. It can be used after flowering plants have germinated and are 2-3 inches tall. Since it does not kill existing weeds, you must first remove any that have already begun to grow. By applying Preen Southern Weed Preventer as early as possible, you can eliminate the need for hand weeding. Rain does not wash this product out of the soil. To keep ornamental beds neat all season long, reapply Preen Southern Weed Preventer every 4 months.

How To Apply Preen Southern Weed Preventer

To avoid plant injury, **do not apply Preen Southern Weed Preventer when foliage is wet.** When plants are dry, sprinkle Preen Southern Weed Preventer on soil surface at rate given below. Once activated by watering, Preen Southern Weed Preventer forms a weed control barrier in the top layer of soil, preventing weed seeds from germinating. Disturbance to the soil surface after activation may result in erratic weed control.

Applying Around Established Plants

For flowers, roses, ground covers, ornamental grasses, shrubs and trees: sprinkle Preen Southern Weed Preventer evenly over the entire soil surface, at the rate of 0.68 oz. per 10 sq. ft. (see picture on right), being sure to keep granules away from plant roots and foliage. Water Preen Southern Weed Preventer into soil surface. Always wash or brush off stray granules from plant foliage to avoid damage or discoloration.

Surface Application Rate Sprinkle granules at the density shown in this picture.



Applying Preen Southern Weed Preventer with Mulch

For best weed control, apply Preen Southern Weed Preventer after spreading mulch on your flower and shrub beds. Sprinkle Preen Southern Weed Preventer on top of mulch at surface rate (see picture above), being sure to keep granules away from plant foliage. Water Preen Southern Weed Preventer into mulch. Always wash or brush stray granules from plant foliage to avoid damage or discoloration.

Preen Southern Weed Preventer Is Suggested For Use Around These Established Plants

BULBS, FLOWERS, GROUND COVERS & ORNAMENTAL GRASSES

Ajuga: Bronze, Beach
Grass
Bronze Beauty
Aster, Chinese: Dwarf
Queen
Basket Flower
Bee Balm
Begonia
Black-eyed Susan:
Goldstrum
Rocket, London
Blanket Flower
Blue Fescue
Bugle Carpet
Caret, Variegated
Celosia
Centaura
Cockscomb, Plumosa:
Scarlet red
Coleus: Red Kewpie
Columbine

SHRUBS

Abelia, Dwarf: Nana
Arboreviata: Nigra,
Pyramidalis
Smaragh, Techny,
Woodwardii
Arboreviata, Golden
Azalea: Brilliant,
Buccaneer, Carror,
Chimes (Belgian),
Elsie Lee, Exbury,
Fashion, Hardizer
Beauty, Hershie
Red, Higasa,
Hinocrimson,
Holland (Hybrid),
Marion Lee,
Northern lights,
Orange Cup, Orchid
Lights, Snow,
Southern charm
Azalea, Flame
Azalea, Kirishima
Bamboo, Heavenly
Barberry: Aurea,

Coreopsis: Moonbeam
Corn Flower
Cotoneaster
Daffodil: King Alfred
Daylily: Aztec Gold,
Bright yellow (hybrid),
Single gold (evergreen),
Wilsonis, Yellow
Dianthus (Sweet William)
Delphinium: Magic
fountain
Dusty miller
Fern (various)
Fescue
Fountain Grass
Galium
Geranium
Hosta: Albo Marginata
Ice plant
Impatiens

Dwarf Pigmy,
Green, Kobold,
Pygmy Red, Rose
glow
Barberry, Purple:
Atropurpurea
Bearberry (common)
Massachusetts
Bottlebrush
Boxwood, Japanese
Boxwood, Weller
Broom:
Moonlight,
Vancouver Gold
Camellia: Debutante,
Mathotiana
Supreme,
Chansonette
Candy Tuft: Snow
White
Cedar, Red
Copper Leaf
Coyotebrush
Cycads
Euonymus:

Iris: Dwarf blue,
Wedgewood
Ivy, English: Bulgaria,
Thorndale
Jasmine, Asian
Lily, African: Lily,
African blue
Lilyturf: Evergreen giant,
Lilac beauty, Majestic,
Monroe white,
Variegata
Liriope, Green
Marigold: Honeycomb,
Variegata, Wheeleris
dwarf
Mondo Grass
Moss Rose: Sunnyside
Narcissus
Osteospermum:
Wirrigig

Argenteo-variegata,
Auereo-marginata,
Colorata, Emerald
Gaiety, Emerald
Gold, Gold Edge,
Gold Princess, Silver
King, Tricolor, Vegetus
Fetterbush: Rainbow
Forsythia: Arnold
Dwarf, Bronxensis
Dwarf, Lynwood
Gold, Meadowlark,
Weeping
Fuchsia Gardenia:
Mystery, Radicans
Heather, Twisted:
Mediterranean Pink
Hibiscus: Blue bird,
Brilliant, Hula girl
Holly: Blue boy, Blue
girl, Burfordii, China
girl, Compacta,
Forsteri, Hellerie,
Japanese northern
beauty, Needlepoint,

Pachysandra
Pampas grass
Pansy
Periwinkle, Dwarf
Petunia: Picoti
Ribbon grass
Rockcress: Snowcap
Salvia: Rhea
Sedum: Dragon blood red,
Red carpet, Yellow
Snapdragon
Sweetflag, Grassy-Le
Trumpet flower, Evening
Tulip: Apeldoorn
Tufted hairgrass
Vervain: St. Paul
Vinca (Periwinkle)
Yarrow

Nellie R. Stevens,
Savannah
Holly, Chinese
Holly, Japanese
Holly, Yaupon
Honeysuckle:
Claveyis Dwarf,
Halliana, Tatarian
Canadian White,
Zebelli, Red Hosta
Juniper: Arcadia,
Armstrong, Bar
Harbor, Blue Chip,
Blue Pacific, Blue
Rug, Blue Star,
Broadmoor, Buffalo,
Calgary Carpet,
Emerald Sea,
Emerald Spreader,
Endora Compacta,
Fruilandil, Green,
Gold Tip, Hetzi,
Hughes, Manhattan
Blue, Parsoni,
Pfitzeriana, Plumosa,

NONBEARING FRUIT AND NUT TREES AND PLANTS*

Apple;
Blueberry: Bluecrop,
Blue Jay, Jersey, North

Prince of Whales
Procumbens Dwarf,
San Jose, Sargent
Blue, Sargent Green,
Scandlia, Scopolorum
Moonglow
Scoloporum
Skyrocket, Spartan,
Tamariscifolia,
Weberi,
Youngstown, Yukon
Belle
Laurel, Australian
Laurel, Mountain
Leucothoe
Ligustrum, Japanese
Lily of the Valley:
Mt. Fire
Myrtle, Crape: Faurei,

Elm, Drake
Fan Palm, European
Fan Palm, Mexican
Ficus
Fir Fraser
Gum
Hawthorn: Cocksbur
White, Crimson
Cloud, Enchantress,
Jack Evans,
Washington White
Hemlock, Canada
King Palm
Maple, Japanese
Maple, Norway

Blue, Northland
Mock orange: Golden,
Snowflake Double

Royal, Texanum,
Wax, Yellow Tipped
Privet, Glossy
Pyracantha: Gnome,
Lalandei, Victory
Rhododendron:
Album, Cunningham
White, Fashion,
Hardy, PJM, Purple
Gem, Silvery Pink
Rhododendron,
Carolina
Rhododendron, Catawba
Rodie Max (Rosebay)
Rose: Luta
Rosemary, Bog:
Nana
Spiraea:
Anthony Waterer

Maple, Red
Maple, Silver
Maple, Sugar
Oak, Laurel
Oak, Pin
Oak, Red
Oak, Southern L
Oak, Willow
Palm, Bangalow
Pine, Australian
Pine, Japanese Black
Pine, Loblobly
Pine, Longleaf
Pine, Scotch
Pine, Slash

White Peach
Quince, Japanese

red, Dolchica, Fanal,
Froebeli Pink,
Goldenflame Red,
Snowmound White,
Van Houthe White
Spriaea, Garland
Verbena, Shrub
Virburnum: American
Cranberry Bush,
Arrowwood, Common
snowball, European
cranberry bush,
Linden, Mohican,
Wright
Xylosma
Yaupon: Dwarf;
Yew: Denisiformis

Pine, Virginia
Pine, White
Queen Palm
Sourwood
Spruce: Black Hills
Spruce, Colorado Blue
Spruce, Norway
Spruce, White
Sweetgum
Sycamore
Tree fern (Tiki fern)
Windmill Palm

Warranty

NOTE: To the extent consistent with applicable law. Buyer assumes all responsibility for safety and performance if this product is not used according to the directions.

*Ornamental species only: Do not use on food producing trees and ornamentals.

Preen

SOUTHERN

WEED PREVENTER

**STOP WEEDS*
Before They Start!**

**No apto para uso en
jardines de hortalizas o céspedes**

Matar Las Malas Hierbas Versus Prevención De Malas Hierbas



Tirar o pulverizar sólo elimina las malas hierbas* ya por encima del suelo.



Prevención crea una barrera que impide que las malas hierbas* las malas hierbas germinen.

Reaplique producto cada 4 meses. Nunca es demasiado tarde o demasiado pronto para aplicar Jardín Preen Weed. Use alrededor de flores, verduras, árboles y arbustos.

*Vea las instrucciones de uso para la lista completa de las malezas tratadas.

Lea el código para ver cómo Preen evita las malas hierbas o visite:

<http://www.preen.com/preventweeds>



El rutina de Preen sencillos pasos para prevención de malas hierbas



Quite las malas hierbas existentes



Rocíe uniformemente producto



El agua del producto en el suelo

Declaraciones de precaución

RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN

Provoca irritación ocular moderada. El producto es nocivo si se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si el pesticida traspasa la ropa, el usuario deberá quitársela de inmediato. Luego, deberá lavarse bien y colocarse ropa limpia. En algunas personas, el contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el inodoro.

Primeros auxilios

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:

- Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.
- Si usa lentes de contacto, retírelos luego de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.
- Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.

SI SE INGIERE:

- Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.
- Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua.
- No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.
- Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA:

- Quite la ropa contaminada.
- Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua entre 15 y 20 minutos.
- Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.

SI SE ASPIRA:

- Lleve la persona a un lugar con aire fresco.
- Si la persona no respira, llame al 911 o una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible.
- Llame a un centro de control de envenenamientos para obtener asesoramiento adicional sobre el tratamiento.

Quando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información sobre emergencias médicas, llame al (888) 208-1368.

Riesgos ambientales

Este producto es tóxico para los peces. El sedimento y el residuo líquido pueden perjudicar a los organismos acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escorra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo ayudará a asegurar que el viento no sople el pesticida fuera del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del jardín para evitar que se escorra hacia aguas superficiales o sistemas de drenaje.

Instrucciones de uso

Constituye violación de la Ley Federal utilizar este producto de una manera distinta a la estipulada en la etiqueta.

Información Del Producto

El controlador de malezas Preen Southern evita la germinación de la mayoría de las malezas por hasta 4 meses en macizos de flores y alrededor de cubiertas vegetales, árboles y arbustos. Aunque este producto no mata las malezas existentes, evitará la germinación de nuevas lista malezas, lo que elimina la dificultad y la pérdida de tiempo de desmalezar a mano. Sin malezas, sus valiosas plantas podrán crecer más grandes y fuertes. Sus macizos se mantendrán arreglados y limpios durante toda la temporada.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

No lo use en plantas que se hayan cultivado para la venta u otro uso comercial, para la producción comercial de semillas ni para fines de investigación. Úselo en plantas destinadas para fines estéticos o modificaciones climáticas, y que se estén cultivando en jardines ornamentales. No aplique el producto de ninguna manera en que pueda entrar en contacto con personas o mascotas, ya sea directa o indirectamente. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación.

APTO PARA USO RESIDENCIAL/ NO APTO PARA USO EN JARDINES DE HORTALIZAS O CÉSPEDES

Aplique el controlador de malezas Preen Southern solo en las plantas ornamentales establecidas enumeradas en esta etiqueta. No aplique en plantas que estén bajo estrés. No aplique de manera excesiva ni mezcle este producto en el suelo, ya que puede producir daños a las plantas sensibles al controlador de malezas Preen Southern. Este producto no se debe usar en jardines de hortalizas, céspedes ni en áreas cerradas como invernaderos. No aplique otro herbicida dentro de las 4 semanas desde la aplicación de este producto. No aplique más de 1,93 kg de este producto por cada 92,90 m² por aplicación, y no más de 5,78 kg de este producto por cada 92,90 m² por año.

En el estado de Nueva York, no aplique más de 0,95 kg por cada 92,90 m² por año, (equivalente a 0,11 kg de ingrediente activo por cada 0,40 ha).

Se prohíbe el uso de este producto en los condados de Nassau y Suffolk en Nueva York.

RESTRICCIONES DE ENTRADA

No permita que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. Si se va a regar el producto, no ingrese ni permita que otros ingresen en las áreas tratadas (excepto quienes deben regar el producto) hasta que el riego esté completo y la superficie esté seca.

Malezas que controla

MALEZAS HERBOSAS:			
Cebada	Botón de oro	Cola de zorro: Verde, amarilla	Rosetilla
Capin arroz	Digitaria: Grande, suave, del sur	Césped Kikuyo	Pasto alambre
Césped azul: Anual	Pasto miel (plántulas)	Avena silvestre	
Bromo	Pata de gallina	Ballico: Anual, perenne	
MALEZAS DE HOJA ANCHA:	Sanguinaria postrada	Hierba de la piña	Verónica arvensis
Mastuerzo amargo	Treból de los prados común	Yuyo colorado	Hierba de golondrina: De jardín, postrada, manchada
Culantrillo	Cenizo	Alquimila arvense	Acedera menor: Rastrea, amarilla
Pampina	Corregüela hembra	Verdolaga común	
Geranio Carolina	Lupulina	Matacanal	
Ortiga muerta	Mostaza	Bolsa de pastor	

Cuándo aplicar el controlador de malezas Preen Southern

Aplique el controlador de malezas Preen Southern durante la temporada de crecimiento solo alrededor de plantas establecidas. El controlador de malezas Preen Southern no se debe usar en semillas de flores. Se puede usar después de que las plantas en floración hayan germinado y tengan de 5,08 a 7,62 cm de alto.

Dado que no mata las malezas existentes, deberá quitar primero cualquier maleza que haya comenzado a crecer. Si aplica el controlador de malezas Preen Southern lo antes posible, podrá eliminar la necesidad de desmalezar manualmente. La lluvia no elimina este producto del suelo. Para mantener los macizos de flores libres de malezas durante toda la temporada, vuelva a aplicar el controlador de malezas Preen Southern cada 4 meses.

Cómo aplicar el controlador de malezas Preen Southern

Para evitar daños en la planta, no aplique el controlador de malezas Preen Southern cuando el follaje esté mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe el controlador de malezas Preen Southern en la superficie del suelo según las dosis que se indican a continuación. Una vez que se haya activado mediante el riego o su incorporación al suelo, el controlador de malezas Preen Southern forma una barrera de control contra malezas en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. La alteración de la superficie del suelo después de la activación puede perjudicar el resultado del control de maleza.

Aplicación alrededor de plantas establecidas

Para flores, rosas, cubiertas vegetales, céspedes ornamentales, arbustos y árboles: Rocíe el controlador de malezas Preen Southern de manera uniforme sobre toda la superficie del suelo, con una dosis de 20,11 cm² por cada 0,93 m² (consulte la imagen a la derecha), asegurándose de mantener los gránulos alejados de las raíces y el follaje de las plantas. Riegue inmediatamente el controlador de malezas Preen Southern para que se incorpore en la superficie del suelo. Lave o limpie siempre los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.



Dosis de aplicación en la superficie: Espolvoree los gránulos a la densidad se muestra en esta imagen.

Para aplicar el controlador de malezas Preen Southern con compuesto orgánico

Para obtener un mejor control de las malezas, recomendamos aplicar el controlador de malezas Preen Southern después de esparcir compuesto orgánico en los macizos de flores y arbustos. Rocíe el controlador de malezas Preen Southern sobre el compuesto orgánico según la proporción de la superficie (consulte la imagen de abajo a la izquierda), asegurándose de mantener los gránulos alejados del follaje de las plantas. Water Preen Southern Weed Preventer into mulch. Lave o limpie siempre los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o la decoloración.

Se recomienda usar el controlador de malezas Preen Southern alrededor de las siguientes plantas establecidas

BULBOS, FLORES, CUBIERTAS VEGETALES Y CÉSPEDES ORNAMENTALES:

Ajuga: Bronze, Beach	Hemerocallis: Aztec	Liriope: Evergreen giant,	Bignonia Evening
Ajuga Bronze Beauty	Gold, Bright yellow	Lilac beauty, Majestic,	Tulipán: Apeldoorn
Áster chino: Dwarf	(hibrida), Single gold	Monroe white, variegado	Deschampsia
Queen	(perenne), Wilsons	Liriope verde	Verbena: St. Paul
Centaurea americana	Yellow Clavel (del poeta)	Maravilla: Honeycomb,	Vinca (Pervinca)
Bergamota silvestre	Espuela de caballero:	variegada, Wheellets	Milienrama
Begonia	Magic fountain	enana	
Rudbeckia: Goldstrum	Senecio cineraria	Convalaria	
Gallardia	Helecho (varios)	Portulaca: Sunnyside	
Festuca azul	Festuca	Narciso	
Búgula	Penisetum chino	Caléndula: Wirilgig	
Cárex variegado	Galium	Diamante	
Celosía	Geranio	Hierba de la pampa	
Centaurea	Hosta: Albo marginata	Pensamiento	
Cresta de gallo	Delosperma	Vinca pervinca enana	
plumosa:	Alegria de la casa	Petunia: Picoti	
Scarlet Plumosa	Lirio: azul enano,	Falaris	
Cóleo: Red Kewpie	Wedgewood	Arabis: Snowcap	
Aguileña	Hiedra: Bulgaría,	Salvia: Rhea	
Coreopsis: Moonbeam	Thorndale	Sedum: Dragon blood	
Aciano	Jazmín de leche	red, Red carpet, Yellow	
Cotoneaster	Lilium africano: Lilium	Boca de dragón	
Narciso: King Alfred	African Blue	Sweetflag, Grassy-Le	

ARBUSTOS

Abelia enana: Nana
Tuya: Negra, Pyramidali, Smaragh, Techny, Woodwardii
Tuya Golden
Azalea: Brilliant, Buccaneer, Carror, Chimes (Belga), Elsie Lee, Exbury, Fashion, Hardjizer Beauty, Hershede Red, Higaša, Hinocrimson, Holland (hibrida), Marion Lee, Northern lights, Orange Cup, Orchid Lights, Snow, Southern charm
Azalea Flame
Azalea Kirishima
Bambú divino
Agracejo rojo: Aurea, Dwarf Pigmy, Green, Kobold, Pygmy Red, Rose Glow
Agracejo púrpura: Atropurpurea
Gayuba (común) Massachusetts
Boj japonés
Boj Weller
Retama: Moonlight, Vancouver Gold
Camelia: Chansonette, Debutante, Mathotiana Supreme
Cestillo de plata: Snow White
Cedro rojo
Hoja de cobre
Arbusto coyote
Cicades
Evónimo: Argenteo-variegata, Auereo-marginata, Colorata, Emerald

Gaiety, Emerald eN Gold, Gold Edge, Gold Princess, Silver King, Tricolor, Vegetus
Lyona lucida: Rainbow
Forsitia: Arnold enana, Bronzensis enana, Lynwood Gold, Meadowlark, Weeping
Fucsia Gardenia: Mystery, Radicans
Brezo torcido: Mediterranean Pink
Hibisco: Blue bird, Brilliant, Hula girl
Acebo: Blue boy, Blue girl, Burfodii, China girl, Compacta, Forstere, Hellerie, Japanese northern beauty, Needlepoint, Nellie R. Stevens, Savannah
Acebo chino
Acebo japonés
Acebo Yaupon
Lonicera: Claveyis enana, Halliana, Tatarian Canadian White, Zebelli, Red Hosta
Junipero: Arcadia, Armstrong, Bar Harbor, Blue Chip, Blue Pacific, Blue Rug, Blue Star, Broadmoor, Buffalo, Calgary Carpet, Emerald Sea, Emerald Spreader, Endora Compacta, Fruittandi, Green, Gold Tip, Hetzi, Hughes, Manhattan Blue, Parsoni, Pflizeriana, Plumosa, Prince of Whales, Procumbens Dwarf, San Jose, Sargent Blue,

Sargent Green, Scandia,
Scopolorum Moonglow
Scopolorum Skyrocket,
Spartan, Tamariscifolia,
Weberi, Youngstown,
Yukon, Belle
Laurel australiano
Laurel de montaña
Leucothoe
Aligustre japonés
Azucena del valle: Mt. Fire
Árbol de Júpiter: Faurei, Langer, Muskogee, Standard Pink
Mirto de cera
Nandina: Compacta, enana
Adelta: Hardy Red, Petite Pink, Sister Agnes
Fior de papel: Barbara Karst
Fotinia Red Tip
Pieris
Pino: Mugho
Pino Swiss Mt.
Feijoa
Pitosporo japonés
Cincoenrama: Abbotswood
Aligustre: Golden Vicary, Regal, Texanum, Wax, Yellow Tipped
Aligustre arbóreo
Piracanta: Gnome, Lalandei, Victory
Rododendro: Album, Cunningham White, Fashion, Hardy, P.J.M, Purple Gem, Silvery Pink
Rododendro Carolina
Rododendro Catawba
Laurel grande (rosa de la bahía)
Rosa: Luta
Andrómeda: enana

Esiprea: Anthony Waterer red, Dolchica, Fanail, Froebell Pink, Goldenflame Red, Snowmound White, Van Houtte White
Esiprea Garland
Arbusto de verbena
Viburno: Americano, Cranberry Bush, Arrowood, Common snowball, European, Linden, Mohican, Wright
Esipina corona
Yaupon: Enano
Tejo: Denisiformis

ÁRBOLES

Almendro en floración

Fresno: Green,
Mountain, Purple
Abedul de río

Ciprés calvo

Ciprés italiano: Azul
Falso ciprés japonés:

Gracilis

Ciprés de Leyland

Cornejo

Cornejo americano:

Flaviramínea

Abeto Douglas

Olmo Drake

Palmito europeo

Palmera mexicana

Ficus

Abeto Frasier

Goma

Espino: Cockspur

White, Crimson Cloud,

Enchantress, Jack

Evans, Washington

White

Falso abeto del Canadá

Palma King

Arce japonés

Arce de Noruega

Arce rojo

Arce plateado

Arce azucarero

Roble laurel

Roble de los pantanos

Roble rojo

Roble del sur L

Roble sauce

Palma Bangalow

Pino australiano

Pino negro japonés

Pino de incienso

Pino de hoja larga

Pino escocés

Pino Slash

Pino de Virginia

Pino blanco

Palma de la reina

Oxydendrum arboreum

Picea Black Hills

Picea Colorado Blue

Picea de Noruega

Picea blanca

Liquidámbar americano

Sycamore

Helecho (Helecho Tiki)

Palmito elevado

ÁRBOLES Y PLANTAS QUE NO PRODUCEN FRUTOS O FRUTOS SECOS:†

Manzano

Arándano

Bluecrop, Blue

Jay, Jersey, North

Blue, Northland

Celinda:

Golden, Snowflake

Double White

Melocotonero

Quince, japonés

†Solo especies ornamentales: No use en árboles productores de frutos ni ornamentales.

Almacenaje y eliminación

No contamine el agua, los alimentos o el forraje al almacenar o eliminar el producto.

Almacenaje del pesticida: Almacene el producto en su envase original en un lugar fresco, seco, seguro y fuera del alcance de los niños y animales. **Eliminación del pesticida y manipulación del envase:** El envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni llenar este envase. **Si está vacío:** Colóquelo en la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca coloque productos que no utiliza debajo de un drenaje externo o interno.

Garantía

NOTA: En la medida que lo permita la ley vigente, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el desempeño si este producto no se usa de acuerdo con las indicaciones.

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Consulte el panel posterior para obtener información sobre

primeros auxilios y otras declaraciones de precaución adicionales.

Consulte las instrucciones de uso para ver una lista completa de las malezas tratadas.

DETIENE LAS MALEZAS* antes de que aparezcan

Bloquea la maleza* durante 4 meses, garantizado.

Incluye PALA DE APLICACIÓN

Peso Neto: 1,9 kg (4.25 lbs.)

Cubre 92,9 m²

INGREDIENTE ACTIVO:

Ditiopir 0,27%

OTROS INGREDIENTES 99,73%

TOTAL 100,00%

CAS No. 97886-45-8

EPA Reg. No.961-410

(L) (D)

EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01

El superíndice usado es la primera letra del número de lote.

Preen® es una marca registrada de Lebanon Seaboard Corporation.



1-800-233-1067

www.preen.com



Manufactured by | Fabricado por:
Lebanon Seaboard Corporation 1600 East Cumberland Street, Lebanon, PA 17042